

Pfingstexkursion 1959 Herlingsweiher Krs.Ellwangen 19.+20.V.

<i>Nebria brevicollis</i> F.		Schr.
<i>Elaphrus riparius</i> L.	Kb.	Schr. Ul.
<i>Loricera pilicornis</i> F.	Kb.	Schr.
<i>Bembidion properans</i> Steph.		Schr.
<i>dentellum</i> Thunb.		Schr.
<i>varium</i> Ol.	Kb.	
<i>rupestre</i> L.	Kb.	Schr. Ul.
<i>ustulatum</i> L.	Kb.	Schr.
<i>fluviatile</i> Dej.		Schr. Ul.
<i>illigeri</i> Net.		Ul.
<i>quadripustulatum</i> Serv. (<i>quadriguttatum</i> Ol.)		Schr.
<i>articulatum</i> Gyll.	Kb.	Ul.
<i>biguttatum</i> F.		Schr.
<i>Chlaenius nigricornis</i> F.		Schr.
<i>Pterostichus cupreus</i> L.		Schr.
<i>Agonum marginatum</i> L.		Schr.
<i>Halplus ruficollis</i> Deg.	Kb.	
<i>fluviatilis</i> Aubé	Kb.	Schr.
<i>immaculatus</i> Gerh.	Kb.	
<i>laminatus</i> Schall.	Kb.	
<i>flavicollis</i> Sturm	Kb.	
<i>Noterus crassicornis</i> Muell.	Kb. Kb.	Schr.
<i>clavicornis</i> Deg.	Kb.	
<i>Hygrotus inaequalis</i> F.	Kb.	
<i>Graptodytes pictus</i> F.	Kb.	Schr.
<i>Halophorus guttulus</i> s. <i>brevipalpis</i> Bed.	Kb. Kb.	Schr.
<i>flavipes</i> F. (<i>viridicollis</i> St.)	Kb.	Schr.
<i>Hydrochus carinatus</i> Gers.	Kb.	Schr.
<i>Coelostoma orbiculare</i> F.	Kb. Kb.	Schr.
<i>Cercyon ustulatus</i> Freyss.	Kb.	
<i>Laccobius minutus</i> L.	Kb.	Schr.
<i>striatulus</i> F.	Kb.	
<i>bipunctatus</i> F. (<i>alutaceus</i> Thoms.)	Kb.	
<i>Melochares lividus</i> Forst. (<i>griseus</i> F.)	Kb.	
<i>Enochrus melanocephalus</i> Ol.	Kb.	
<i>quadripunctatus</i> s. <i>fuscipennis</i> Th.		Schr.
<i>testaceus</i> F.	Kb.	
<i>Lesteva longelythrata</i> Gze.	Kb.	
<i>Stenus biguttatus</i> L.	Kb. Kb.	Schr.
<i>bipunctatus</i> Er.	Kb. Kb.	
<i>incrassatus</i> Er.	Kb.	
<i>Philonthus atratus</i> Grav.	Kb.	Schr. Ul.
<i>Aleochara curtula</i> Grav.	Kb.	
<i>Dryops ernesti</i> Coz.	Kb.	
<i>luridus</i> Er.	Kb.	
<i>Anthrenus pimpinellae</i> F.	Do.	
<i>Telmatochilus caricis</i> Ol.	Do.	
<i>Cryptophagus saginatus</i> Strm.		Ul.
<i>collaris</i> Scop.		Ul.
<i>affinis</i> Strm.		Ul.
<i>Anisosticta 19-punctata</i> L.	Kb.	
<i>Donacia simplex</i> F.	Kb.	
<i>Gastroidea viridula</i> Deg.		Schr.
<i>Phaedon armoraciae</i> L.		Schr.
<i>Phyllocteta vulgatissima</i> L.	Kb.	
<i>Sitona humeralis</i> Steph.	Kb.	
<i>Dorytomus schoenherri</i> Pst.	Do.	
<i>longimanus</i> Forst.	Kb.	
<i>trimalae</i> Fk.	Kb.	
<i>tortrix</i> L.	Do.	
<i>Phyllobius arcticae</i> Deg.		Ul.
<i>Calandra granaria</i> L.	Kb.	Schr. Ul.

Pfingstexkursion 1959 an den Espachweiher Krs. Ellwangen Blatt 1.

<i>Carabus auronitens</i> F.		Kb.		
<i>arcensis</i> Hbst.		Kb.		
<i>nemorialis</i> Muell.		Kb.		
<i>Notiophilus biguttatus</i> F.		Kb.		
<i>Blaphrus riparius</i> L.	Do.			
<i>Amara familiaris</i> Dft.		K8.		
<i>Pterostichus minor</i> Gyll.				Ul.
<i>Agonum micans</i> Nicol.		K8.		
<i>gracile</i> Gyll.			Schr.	Ul.
<i>fuliginosum</i> Pans.				Ul.
<i>Haliphus ruficollis</i> Deg.		K8.		
<i>fluviatilis</i> Aubé			Schr.	
<i>flavicollis</i> Strm.	Do.		Schr.	Ul.
<i>Noterus crassicornis</i> Muls.		K8.		
<i>Hyphydrus ovatus</i> L.		Kb. K8.		Schr.
<i>Ilybius fuliginosus</i> F.				Schr.
<i>Rhantus punctatus</i> Geoffr.				Schr.
<i>Acilius sulcatus</i> L.		Kb.		
<i>Gyrinus marinus</i> Gyll.				Ul.
<i>substriatus</i> Steph. (natator)	Do. Kb.			
<i>Coelostoma orbiculare</i> F.				Ul.
<i>Hydrobius fuscipes</i> L.				Ul.
<i>Anacaena globulus</i> Fk.				Ul.
<i>limbata</i> F.		K8.		
<i>Enochrus testaceus</i> F.				Ul.
<i>Necrophorus vespilloides</i> Hbst.				Ul.
<i>Anthobium primulae</i> Steph.				Ul.
<i>minutum</i> F.	Do.	K8.-	Schr.	Ul.
<i>florale</i> Ps.				Ul.
<i>Gmalium rivulare</i> Fk.			Schr.	Ul.
<i>Stenus juno</i> F.				Ul.
<i>rogeri</i> Kr.				Ul.
<i>bimaculatus</i> Gyll.		K8.		
<i>atratus</i> Er.				Ul.
<i>tarsalis</i> Lj.	Kb. K8.		Schr.	Ul.
<i>similis</i> Hbst.			Schr.	Ul.
<i>cicindeloides</i> Schall.		K8.	Schr.	
<i>pallitarsis</i> Steph.			Schr.	Ul.
<i>pubescens</i> Steph.		Kb.		
<i>bifoveolatus</i> Gyll.		Kb.		Ul.
<i>Lathrobium terminatum</i> Grav.				Ul.
<i>Gabrius nigritulus</i> Grav.		K8.		
<i>trossulus</i> Nordm.				Ul.
<i>Quedius umbrinus</i> Er.				Ul.
<i>Tachyperus chrysomelinus</i> L.		K8.		
<i>Chilopera longitarsis</i> Er.	Do.			
<i>Cantharis obscura</i> L.		K8.		
<i>rufa</i> L.	Do.			
<i>paludosa</i> Fall.	Do.			
<i>Rhagonycha testacea</i> L.	Do.	K8.	Schr.	Ul.
<i>limbata</i> Thoms.				Ul.
<i>Charopus flavipes</i> Payk.	Do.			
<i>Malachius marginellus</i> Ol.			Schr.	
<i>bipustulatus</i> L.		Kb. K8.	Schr.	Ul.
<i>Athous subfuscus</i> Muell.			Schr.	
<i>Corymbites pectinicornis</i> L.	Do.			
<i>cupreus</i> v. <i>aeruginosus</i> F.				Ul.
<i>sjaelandicus</i> Muell.				Ul.
<i>Prosternum tessellatum</i> L.	Do.		Schr.	
<i>Agriotes obscurus</i> L.			Schr.	

Pfingstexkursion 1959(20.5.) an den Espachweiher Kra. Ellwangen. Bl. 2

<i>Dolopius marginatus</i> L.		K8.		Schr.
<i>Denticollis linearis</i> L.		K8.		
<i>Anthaxia quadripunctata</i> L.		Kb.		
<i>Cyphon coarctatus</i> Bayk.		K8.		Ul.
<i>variabilis</i> Thunb.				Schr.
<i>Padi</i> L.		K8.		Ul.
<i>pubescens</i> F.		K8.		
<i>Eyturus tomentosus</i> F.		K8.		
<i>Meligethes hebes</i> Er.		K8.		Ul.
<i>aeneus</i> F.		K8.		
<i>viridescens</i> F.		K8.		
<i>viduatus</i> Strm.		K8.		
<i>Atomaria mesomelina</i> Hbst.				Ul.
<i>Phalacrus caricis</i> Strm.		K8.		
<i>Enicmus minutus</i> L.				Ul.
<i>Corticarina gibbosa</i> Hbst.				Ul.
<i>Subcececinella</i> 24-punctata L.		K8		Schr.
<i>Coccidula scutellata</i> Hbst.	Do.			Ul.
<i>rufa</i> Hbst.		K8,		Ul.
<i>Seymus haemorrhoidalis</i> Hbst.				Ul.
<i>Hippodamia</i> 13-punctata L.	Do.			Ul.
<i>Anisosticta</i> 19-punctata L.	Do. Kb.	K8.		Schr. Ul.
<i>Halyzia</i> 16-punctata L.				Schr.
<i>Sospita vigintipunctata</i> L.			Liebma.	
<i>Propylaea</i> 14-punctata L.		Kb. K8.		
<i>Anaspis frontalis</i> L.	Do.			
<i>rufilabris</i> Gyll.				Ul.
<i>Aphodius fimetarius</i> L. K8.		Kb.		
<i>Tetropium castaneum</i> L.		Kb.		
<i>Toxotus cursor</i> L.		Kb.		
<i>Cortodera femorata</i> F.		K8.		
<i>Melerochus minor</i> F.				Ul.
<i>Agapanthia villosoviridescens</i> Deg.		Kb.		
<i>Donacia aquatica</i> L.		K8.		Schr. Ul.
<i>impressa</i> Payk.	Do. Kb.	K8.		Schr. Ul.
<i>marginata</i> Hoppe	Do.			
<i>bicolor</i> Esch.		K8.		
<i>simplex</i> F.	Do.	K8.		Schr.
<i>Plateumaris sericea</i> L.	Do. Kb.	W8.		Schr. Ul.
<i>braccata</i> Scop.				Ul.
<i>consimilis</i> Schrk.	Do. Kb.	K8.		Schr. Ul.
<i>affinis</i> Kze.		K8.		
<i>rustica</i> Kze.				Schr.
<i>Lema erichsoni</i> Suffr.		K8.		
<i>lichenis</i> Voet.		K8.		Schr.
<i>Gastroidea viridula</i> Deg.		K8.		Schr.
<i>Phaedon cochleariae</i> F.		K8.		Ul.
<i>armoraciae</i> F.				Schr. Ul.
<i>Hydrothassa glabra</i> Hbst.	Kb. K8.			
<i>Phyllodecta vitellinae</i> L.		K8.		
<i>atrovirens</i> Corn.	Kb. (?)			
<i>Galerucella nymphaeae</i> L.		K8.		Ul.
<i>griseescens</i> Joann.		K8. (???)		
<i>calmariensis</i> L.	Do.	K8(?)		
<i>pusillus</i> Dft.				Ul.
<i>Lochaesa cypraea</i> L.		K8.		
<i>Longitarsus melanocephalus</i> Deg.		K8.		
<i>Psylliodes thlaspis</i> Poudr.				Ul.
<i>Cassida viridis</i> L.		Kb.		
<i>flaveola</i> Thunb. a. <i>litoralis</i>	Do.			
<i>rubiginosa</i> Muell.		Kb.		
<i>Bruchus atomarius</i> L.		K8.		Ul.

Pfingstexkursion 20.5.59 Espachweiher Krs.Ellwangen , Blatt 3.

<i>Apion violaceum</i> Kirby		Kö.		
<i>curtirostre</i> Germ.			Schre.	
<i>millum</i> Bach		Kö.		
<i>virens</i> Hbst		Kö.		
<i>aestivum</i> Germ.				Ul.
<i>apricans</i> Hbst.				Ul.
<i>Phyllobius piri</i> L.	Kb.	Kö.	Schre.	
<i>arborator</i> Hbst.		Kö.		
<i>calcaratus</i> F.			Schre.	
<i>Sciaphilus asperatus</i> Hensd.		Kö.		
<i>Strophosomus melanogrammus</i> Fürst.		Kö.	Schre.	
<i>Sitona lineatus</i> L.			Schre.	
<i>sulcifrons</i> Thunb.		Kö.	Schre.	Ul.
<i>flavescens</i> Marsh.				Ul.
<i>humeralis</i> Steph.		Kö.		Ul.
<i>Rhinochylus cenicus</i> Fröhl.	Kb.			
<i>Thryogenes nereis</i> Payk.	Kb.	Kö.		
<i>festucae</i> Hbst.		Kö.		
<i>Magdalis ruficornis</i> L.			Schre.	
<i>Phytonomus ruficornis</i> L.			Schre.	
<i>Limobaris T-album</i> L.		Kö.		
<i>pilistriata</i> Steph.	Do.	Kö.		Ul.
<i>Rhinoncus perpendicularis</i> Reich.		Kö.		Ul.
<i>pericarpus</i> L.		Kö.		Ul.
<i>Ceuthorrhynchus cochleariae</i> Gyll.				Ul.
<i>contractus</i> Marsh.				Ul.
<i>Sirocalodes nigrinus</i> Marsh.			Schre.	
<i>Gymnetron veronicae</i> Germ.				Ul.

Einige Teilnehmer haben keine Fangliste fertiggestellt , so daß diese Zusammenstellung unvollständig bleiben muß . Die Abkürzungen der Sammlernamen sind : Do = Dolderer , Kb=Köstenbader , Kö = Köstlin , Lieb. = Liebmann , Schr. und Schre. = Schrepfer , Ul = Ulbrich .

Pfingstexkursion 29.V.1959 zu den Goldshöfer Sanden Krs.Aalen.

<i>Cicindela hybrida</i> L.	Kb. K8.	
<i>Notiophilus biguttatus</i> F.		Sehr.
<i>Elaphrus riparius</i> L.	Kb.	
<i>Bembidion lampros</i> Hbst.	K8.	
<i>milleri</i> Duv.		Sehr.
<i>rupestre</i> L.		Sehr.
<i>ustulatum</i> L.	Do.	
<i>femoratum</i> Strm.	K8.	Sehr.
<i>illigeri</i> Net.		Ul.
<i>millerianum</i> Heyd.	K8.	
<i>quadripustulatum</i> Serv.	Do.	
<i>articulatum</i> Panz.	K8.	Ul.
<i>lunulatum</i> Fourcr.		Ul.
<i>Harpalus aeneus</i> F.	K8.	
<i>Amara aenea</i> Deg..	K8.	
<i>familiaris</i> Dft.	K8.	
<i>cursor</i> Zimm.	K8.	
<i>Pterostichus cupreus</i> L.	Do.	Sehr.
<i>Abax ater</i> Vill.		Sehr.
<i>parallelus</i> Dft.	K8.	
<i>Agonum marginatum</i> L.	Do.	
<i>Halplus laminatus</i> Schall.	K8.	
<i>Laccophilus minutus</i> L.	K8.	Ul.
<i>Bidessus geminus</i> F.	K8.	
<i>Deroneotes halensis</i> F.	Kb. K8.	Ul.
<i>Limnebius truncatellus</i> Thunb.	Kb.	
<i>Helophorus aquaticus</i> L.		Ul.
<i>Anacaena limbata</i> F.	K8.	Ul.
<i>Laccobius minutus</i> L.	K8.	Ul.
<i>striatulus</i> F.	Kb. K8.	Ul.
<i>bipunctatus</i> F.	K8.	
<i>Anthobium ophthalmicum</i> Fk.		Sehr.
<i>minutum</i> F.		Sehr. Ul.
<i>Oxytelus sculpturatus</i> Grav.	K8.	
<i>Stenus biguttatus</i> L.		Sehr.
<i>bipunctatus</i> Er.	Kb. K8.	
<i>rogeri</i> Kr.		Ul.
<i>bimaculatus</i> Gyll.	Kb.	
<i>boops</i> Lj.	K8.	
<i>tarsalis</i> Lj.		Ul.
<i>similis</i> <i>similis</i> Hbst.	Kb.	
<i>cicindeloides</i> Schall.	Kb.	
<i>Philonthus fulvipes</i> F.	K8.	
<i>Quedius boops</i> Grav.		Sehr.
<i>Bolitobius lunulatus</i> L.		Ul.
<i>Conosoma testaceum</i> F.	K8.	
<i>Tachyporus formosus</i> Matth.		Ul.
<i>Cantharis nigricans</i> Muell.		Sehr.
<i>Rhagonycha limbata</i> Thoms.		Sehr.
<i>elongata</i> Fall.		Sehr.
<i>Malthodes maurus</i> Cast.	Do.	
<i>Melchius bipustulatus</i> L.		Sehr. Ul.
<i>Haplocnemus pini</i> Redt.		Ul.
<i>Laeon murinus</i> L.		Sehr.
<i>Athous haemorrhoidalis</i> F.		Sehr.
<i>subfuscus</i> Muell.	K8.	Sehr. Ul.
<i>Prosternum tessellatum</i> L.		Sehr.
<i>Agriotes seuminatus</i> Steph.		Ul.
<i>obscurus</i> L.		Sehr.
<i>Dolopius marginatus</i> L.		Sehr.
<i>Cytilius sericeus</i> Forst.	Do.	Sehr. Ul.
<i>Meligethes hebes</i> Er.		
<i>coracinus</i> Strm.	K8.	
	K8.	

<i>Meligethes aeneus</i> F.		K8.	
<i>morosus</i> Er.		K8.	
<i>bipipes</i> Strm. (<i>picipes</i>)		K8.	
<i>assimilis</i> Strm.		K8.	
<i>Epuraea silacea</i> Hbst.	Do.		
<i>dep ressa</i> Gyll.			Schr. Ul.
<i>Pityophagus ferrugineus</i> L.		K8.	
<i>Rhizophagus perforatus</i> Er.	Do.		
<i>Hippodamia 13-punctata</i> L.			Schr. Ul.
<i>Synharmonia conglobata</i> L.			Schr. Ul.
<i>Halysia 14-punctata</i> L.			Schr. Ul.
<i>Propylaea 14-punctata</i> L.	Kb.	K8.	
<i>Anatis ocellata</i> L.		K8.	
<i>Dryophilus pusillus</i> Gyll.	Do.		
<i>Oedemera virescens</i> L.		K8.	Schr. Schr.
<i>lurida</i> Marsh.			Ul.
<i>Mordellistena pusilla</i> Gyll. (<i>pseudopusilla</i> ?)			
<i>pseudopusilla</i> Erm.		K8.	
<i>Anaspis frontalis</i> L.		K8.	Schr. Ul.
<i>Tetropium castaneum</i> L.		K8.	
<i>Domacia aquatica</i> L.			Schr. Schr.
<i>simplex</i> F.			Schr. Schr.
<i>Plateumaris consimilis</i> Serk.			Schr. Schr.
<i>Lema lichenis</i> Vest.			Schr. Schr.
<i>melanopa</i> L.		K8.	Schr. Schr.
<i>Gynandrophthalma affinis</i> Ill.			
<i>Adoxus obscurus</i> L.		K8.	
<i>Gastroidea polygoni</i> L.		K8.	
<i>viridula</i> Deg.		K8.	
<i>Phaedon cochleariae</i> F.			Schr. Ul.
<i>armoraciae</i> L.			
<i>Hydrothassa glabra</i> Hbst. (<i>aucta</i> F.)			Schr. Schr.
<i>Flagiodera versicolora</i> Laich.			Schr. Ul.
<i>Timarcha goettingensis</i> L.			Schr. Schr.
<i>Lechmaea capreae</i> L.			
<i>Luperus flavipes</i> L.			
<i>Phyllotreta undulata</i> Kutsch.		K8.	
<i>atra</i> F.		K8.	
<i>Aphthona pygmaea</i> Kutsch.			Ul.
<i>Haltica oleracea</i> L.		K8.	
<i>Cassida flaveola</i> Thunb.	Kb.		
<i>vibex</i> L.			Schr. Schr.
<i>denticollis</i> Suffr.			
<i>nilis</i> L.	Kb.		
<i>Brachytarsus nebulosus</i> Forst.	Do. Kb.	K8.	Schr. Ul.
<i>Ceonorrhinus germanicus</i> Hbst.			Ul.
<i>Apion violaceum</i> Kb.		K8.	
<i>curtirostre</i> Germ.		K8.	Schr.
<i>compactum</i> Desbr.	Do.		
<i>seniculus</i> Kb.			Ul.
<i>onopordi</i> Kb.			Ul.
<i>loti</i> Kb.			Ul.
<i>pisi</i> F.		K8.	
<i>subulatum</i> Kb.			Schr. Schr.
<i>craccae</i> L.		K8.	
<i>cerdo</i> Gerst.	Do.		
<i>virens</i> Hbst.			Ul.
<i>apricans</i> Hbst.		K8.	
<i>assimile</i> Kb.			Schr. Schr.
<i>Phyllobius piri</i> L.	Do.		Schr. Schr.
<i>Strophosomus melanogrammus</i> Foerst.		Kb.	Schr. Schr.
<i>Sitona sulcifrons</i> Thunb.			Schr. Ul.
<i>flavescens</i> Marsh.			
<i>hispidulus</i> F.			Schr.

Pfingstexkursion 20.5.59 zu den Goldhüfer Sanden , Blatt I I.

<i>Miccotergus picirestris</i> F.	Kb.		
<i>Curculio salicivorus</i> Fk.			Ul.
<i>Phytonomus pedestris</i> Fk.	Do.		
<i>Limnobaris pilistriata</i> Steph.			Schr.
<i>Phytobius waltoni</i> Boh.	Do.		
<i>Rhinoncus pericarpus</i> L.		Kb.	Schr.
<i>Gnemeogonus epilobii</i> Fk.	Do.	K8.	Schr. Ul.
<i>Ceuthorrhynchidius troglodytes</i> F.			Schr.
<i>Stenocarus fuliginosus</i> Marsh.			Schr.
<i>Miarus rotundicollis</i> Desbr. (campanulae)			Schr.
<i>Cionus hortulans</i> Geoffr.			Schr.
<i>Dryocoetus autographus</i> Ratz.		K8.	

Pfingstexkursion 21.5.59 , Jagst bei Büchligen / Langenburg.

<i>Bembidion tibiale</i> Dft.	Do.		
<i>Chlaenius nigricornis</i> F.	Do.		
<i>Oodes helopioides</i> F.	Do.		
<i>Agonum gracile</i> Gyll.	Do.		
<i>Orectochilus villosus</i> Muell.		Kb. K8.	Ul.
<i>Hydraena riparia</i> Eug.		Kb.	
<i>Helophorus arvernicus</i> Muls.	Do.		
<i>Trogophloeus bilineatus</i> Steph.	Do.		
<i>Philonthus fulvipes</i> F.	Do.		
<i>Trichodes alvearius</i> F.			Ul.
<i>Hypnoidus dermestoides</i> s. <i>tetrographus</i>	Do.		
<i>Paracardiophorus musculus</i> Er.	Do.		
<i>Pheletes quercus</i> Ol.			Ul.
<i>Stenelmis canaliculatus</i> Gyll.		Kb. K8.	Schr. Ul.
<i>Helmis mauei</i> Bed.		Kb.	Ul.
<i>Limnius tuberculatus</i> Muell.		Kb. K8.	Schr. Ul.
<i>Riolus cupreus</i> Muell.		Kb. K8.	Schr. Ul.
<i>subviolaceus</i> Muell.			Ul.
<i>nitens</i> Muell.		K8.	Ul.
<i>Mordellistena pumila</i> Gyll.	Do.		
<i>Onthophagus verticicornis</i> Laich.	Do.	(Schloßhof Langenburg)	
<i>Acmaeops collaris</i> L.			Ul.
<i>Galerucella calvariensis</i> L.			Ul.
<i>Apion pavidum</i> Germ.	Do.		
<i>Thryogenes Khutz festucae</i> Hbst.			Ul.
<i>Ceuthorrhynchus melanostictus</i> Marsh.		K8.	

Pfingstexkursion 22.5.59. in und an der Lein bei Abtegmünd

<i>Platambus maculatus</i> L.		K8.	
<i>Hydraena nigrita</i> Germ.		K8.	
<i>Helophorus guttulus</i> s. <i>brevipalpis</i> Bed.	Kb.		
<i>Anacaena globulus</i> Payk.	Kb.		
<i>limbata</i> F.	Kb.		
<i>Trogophloeus arcuatus</i> Steph.		K8.	
<i>Stenus biguttatus</i> L.		K8.	
<i>Helichus substriatus</i> Muell.	Buck Kb.	K8.	
<i>Helmis mauei</i> Bed.		Kb. K8.	
<i>Limnius tuberculatus</i> Muell.		Kb. K8.	
<i>Riolus cupreus</i> Muls.		Kb.	
<i>Lathelmis volkmari</i> Panz.		Kb.	

Pfingstexkursion 21.5.59 Helderbach bei Unterreggenbach

<i>Pterostichus vernalis</i> Panz.			Schr.
<i>Hydraena angulosa</i> Muls.		K8.	
<i>gracilis</i> Germ.		K8.	
<i>polita</i> Kiew.		K8.	
<i>nigrita</i> Germ.		K8.	
<i>Oenthebius exculptus</i> Germ.		Kb. K8.	
<i>Helophorus aquaticus</i> L.			Schr.
<i>guttulus</i> s. <i>brevipalpis</i> Bed.		K8.	Schr. Ul.
<i>Anacaena globulus</i> Payk.		K8.	
<i>Laccobius obscuratus</i> Rott.		K8.	
<i>Lesteva punctata</i> Er.		K8.	
<i>longelythrata</i> Gze.	Do.	K8.	Schr. Ul.
<i>Geodromicus nigrita</i> Muell. (spezies propria nach Lehse 1958)		K8.	
<i>plagiatus</i> F.			Schr.
<i>Oxytelus inustus</i> Grav.			Ul.
<i>Stenus guttula</i> Muell.	Do.		
<i>similis</i> Hbst.		Kb.	
<i>pubescens</i> Steph.			Ul.
<i>Cantharis fusca</i> L.			Schr.
<i>Malachius bipustulatus</i> Laich.			Schr.
<i>Pheletes quereus</i> Ol.			Schr. Ul.
<i>Synaptus filiformis</i> F.			Schr.
<i>Denticollis linearis</i> L.		K8.	
<i>Helms maugei</i> Bed.	Kb.		Ul.
<i>Esolus angustatus</i> Muell.	Kb.	K8.	Ul.
<i>Riolus subviolaceus</i> Muell.		K8.	Ul.
<i>Helodes marginata</i> F.		K8.	
<i>Anthrenus scrophulariae</i> L.			Schr.
<i>Hippodamia 13-punctata</i> L.		K8.	
<i>Anisoticta 19-punctata</i> L.			Schr.
<i>Calvia 14-guttata</i> L.	Kb.		
<i>Valgus hamipterus</i> L.	Kb.		
<i>Acanthopops collaris</i> L.			Schr.
<i>Grammoptera ruficornis</i> F.		K8.	
<i>Agapanthia villosivirideascans</i> Deg.		K8.	
<i>violacea</i> F.	Do. Kb.	K8.	Ul.
<i>Tetrops praecusta</i> L.			Ul.
<i>Gynandrophthalma cyanea</i> F.		Kb.	Schr.
<i>Cryptocephalus biguttatus</i> Scop.	Do.		
<i>moraei</i> L.		Kb.	Schr. Ul.
<i>Chrysomela hyperici</i> Forst.			Schr.
<i>fastuosa</i> Scop.			Ul.
<i>Gastroidea polygoni</i> L.			Schr.
<i>Luperus lyperus</i> Sulz.			Ul.
<i>Derocrepis rufipes</i> L.			Ul.
<i>Epithrix atropae</i> Foudr.		K8.	
<i>Psylliodes affinis</i> Payk.		K8.	
<i>Cassida vibex</i> L.			Schr.
<i>Apion sedi</i> Germ.			Ul.
<i>ochropus</i> Germ.		Kb.	
<i>assinile</i> Kirby		K8.	
<i>Phyllobius oblongus</i> L.			Schr.
<i>urticae</i> Deg.			Schr.
<i>Cyphocleonus trisulcatus</i> Hbst.		Kb.	
<i>Bagous X² lutulosus</i> Gyll.			Ul.
<i>Rhinencus perpendicularis</i> Reich		K8.	
<i>pericarpus</i> L.		K8.	Ul.
<i>Rhynchaenus testaceus</i> Muell.			Ul.