

1. *Podabrus alpinus* (PAYKULL, 1798)2. *Cantharis fusca* Linné, 17783. *Cantharis annularis* MÉNÉTRIES, 1836
(*C. oculata* GEBLER, 1827)4. *Cantharis rustica* FALLEN, 1807

6. *Cantharis flavilabris* FALLEN, 1807

Synonym: *Cantharis fulvicollis* FABRICIUS, 1792

Verbreitung: Europa, Kaukasus. Deutschland: Aus allen Bundesländern gemeldet.

Lebensraum: Gerne auf feuchten Wiesen, in Mooren und Flußauen.

Erscheinungszeit: Ende Mai – Juli.

Rote Liste: Deutschland 3 (gefährdet).

Bestimmungshilfe: Länge 5–7,5 mm; Vorderkopf gelbrot, Hinterkopf schwarz; Flügeldecken schwarz, einfach behaart; Halsschild rot, öfters mit schwarzen Mittelfleck, welcher stark vergrößert sein kann; Schildchen schwarz; Hinterleib längs der Mitte dunkel (Foto S. 4).

7. *Cantharis nigra* (DEGEER, 1775)

Synonym: *C. bicolor* HERBST, 1784; *C. thoracica* (OLIVIER, 1790)

Verbreitung: Europa, in Nordeuropa nur im Süden, W-Türkei, Armenien, Kaukasus. In Deutschland überall nachgewiesen, soll jedoch im Osten häufiger sein, als im Westen.

Lebensraum: Vorwiegend an feuchten Stellen auf Wiesen, im Uferbereich von Flüssen, Seen und Teichen, gerne an Schilf, seltener auf trockenen Wiese. Im Alpenbereich kaum über 500 m emporsteigend.

Erscheinungszeit: Mai – August.

Rote Liste: Deutschland 3 (gefährdet).

Bestimmungshilfe: Länge 5 – 7 mm; Vorderkopf und Halsschild rotgelb, Hinterkopf schwarz; Flügeldecken schwarz, Behaarung einfach; sehr selten haben die Flügeldecken einen gelb-roten Längsstreifen; Schildchen rot, die Spitze bisweilen geschwärzt; Hinterleib gelbrot.

